

雜病源流犀燭

沈氏尊生書卷二十二

雜病源流犀燭 面部門

面部病源流

沈金鰲撰

人身之有面猶室之有大門人未入室先見大門人相對先見其面惟先見大門故卽其門之景象可以知其家之貴賤貧富惟先見面故卽其面之形色可以知其病之虛實淺深其理一也何言之面部地分分隸五臟額爲天庭屬心頰爲地閣屬腎左頰屬肝右頰屬肺鼻居面中屬脾故察其色可以辨其病之所在此分隸而不可易者也然而五色又可獨決于明堂明堂者鼻也明堂之色青黑爲痛黃赤爲熱白爲寒又兩目內眥又精明穴就其穴而察五色觀五臟有餘不足六腑強弱形之盛衰可以叅互決死生之變又天中天庭司空印堂額角方廣皆命門部位可以占病之

吉凶。此于分隸。不易之外。又可相參而得者也。總之。面爲諸陽之會。非他處可比。靈樞曰。手之三陽。從手走至頭。足之三陽。從頭走至足。竊考銅人圖。手太陽之脈。從缺盆。貫頸上。頰至目銳眦。手少陽之脈。從缺盆。上耳上角。以屈下頰。至頤。手陽明之脈。從缺盆。上頸。貫頰。交人中。上挾鼻孔。皆從下而上。走于面。足太陽之脈。起于目內眦。上額。交巔。上足少陽之脈。起于目內眦。上抵頭角。足陽明之脈。起于鼻。交頤中。入齒。挾口環唇。倚頰。車上耳前。過客主人。皆從面而下。走至足。此手足六陽之俱會于面也。若諸陰脈。則皆至頸項。無一上于面者。故人面獨耐寒熱。素問曰。人之十二經脈。三百六十五絡。其血氣皆上于面而走空竅。其精氣上走于目。而爲睛。其別氣走于耳。而爲聽。其宗氣出于鼻。而爲臭。其濁氣出于胃。走唇口。而爲味。其氣之津液。皆上熏于面。而皮又厚。其肉堅。故

大熱大寒不能勝之。此面所以爲諸陽之會而非他部之可比也。然六陽之經雖皆至面而手三陽則皆自下而上。面止爲其經歷之處。卽足太陽少陽亦皆起于目眥而非居中以爲主。獨足陽明胃起于鼻。則既有居中馭外之勢。而額而齒而口而唇而頰而耳。凡面部所有之處其脉俱有以維絡之。故面病專屬于胃。如或風熱乘之。則令人面腫。或面鼻色紫。或風刺癢疹。或面熱。或面寒。一皆胃之爲病也。蓋面熱因于胃家鬱熱。或飲食不節。以致胃病漸至。氣短精神少。而生大熱。有時濕火上行。獨燎其面。宜升麻黃連湯面寒因胃中有寒濕。或胃氣虛。故皆不能耐寒。宜升麻附子湯面腫爲胃風症。必飲食不下。形瘦腹大。惡風頭冷汗。或麻木牙關緊急。口不得開。目內蠕動。額與頰車當糊弼牢觸則痛。脉右關弦而緩帶浮。宜升麻湯皆由陽明經絡受風熱毒氣。故若此也。而亦有腎風症。

者面龐浮腫疼痛其色始黑多汗惡風或兼手熱口乾苦渴小便

黃目下腫如卧蚕腹中鳴身重難行少氣時熱熱時從胸背上至

頭此病雖由于腎虛然亦腫于面與胃風症同治宜升麻胃風湯加腎家引經藥

又有面戴陽症一因浮火所冲一因陽氣怫鬱于表一因下虛其

因下虛者面雖赤而不紅活忌用涼藥恐氣消而成大病其因陽

氣怫鬱者當發表不可攻裡火鬱則發之是也瘡瘍亦然仲景言

傷寒少陰症面戴陽由下虛之故宜通脉四逆湯加葱白九莖用

葱白者通陽氣也腮腫亦名炸腮因風熱乘胃或膏梁久積而作

甚有出膿血者宜外用醋調石灰敷之內服加味消毒飲小兒胎毒攻腮發腫尤可畏

宜大連面上紫塊如錢大或滿面俱有乃火熱所滯也宜擦面婦

人頰瘡甚或每年頻發亦屬惡症宜甘家秘方至于風刺粉刺黧癧

癩酒皴肺風瘡熱毒瘡癩鼻臉赤紫黑鱗斑子皮膚瘙癢等症或

由風客皮毛或由痰漬臟腑或由上焦火毒或由脾肺風濕搏熱皆面上雜病也治之俱當以陽明為主俱宜柏連散清上防風湯玉容散連翹散紅玉散然則面之爲部雖不盈尺而所生病不且煩多也哉

面見五色 靈樞曰足厥陰之脉病面塵脫色足少陽之脉病

面微塵手厥陰之脉病面赤足少陰之脉病面黑如炭色足陽

明之脉病面黑又曰太陽病終者面色白絕汗出少陰病終者

面黑齒長而垢太陰病終者面黑皮毛焦 難經曰肝外症面

青善怒心外症面赤善笑脾外症面黃善噫肺外症面白善噎

腎外症面黑善恐善唾 仲景曰寸口脉微而澁微者衛氣衰

澁者榮血不足衛氣衰則面色黃榮血不足則面色青又曰陰

陽俱虛則面色青白

面部凶症 扁鵲曰病人面無光齒齲黑者死面腫色蒼黑者

死。病人榮衛竭絕。面浮腫者死。華佗曰。面黑唇青者死。面青唇黑者亦死。又曰。病人黑色出于天中。天庭者死。丹溪曰。人有病。面上忽見紅點者死。

導引法。養性書曰。熱摩手心。頻拭額上。謂之修天庭。連髮際。二三七遍。面上自然光澤。所謂手宜在面是也。

### 治面部病方十三

升麻黃連湯 面熱 升麻 葛根 各一錢 白芷 七分 犀角 白芍 甘草 各五分 酒黃連 四分 犀角 芎 荆芥 薄荷 各三分 忌酒麵 五辛 食

後溫服

升麻附子湯 面寒 升麻 附子 葛根 白芷 蜜黃芪 各七分 人參 草薢 仁 炙甘草 各五分

益智仁三分 加葱白

升麻葛根湯乃陽明經主藥也加黃連犀角白芷川芎荆芥薄荷以治面熱加附子白芷黃芪人參草薢益智以治面寒良以面熱為胃熱上熏面寒為胃虛故也

升麻胃風湯

胃風 升麻二錢 甘草錢半 白芷錢二分 當歸 葛根 蒼朮各一錢 麻黃五分

柴胡 葉本 羌活 草豆蔻 黃柏各三分

蔓荊子二分 姜 棗

犀角升麻湯

犀角錢半 升麻 羌活 防風各一錢 白附子 白芷 川芎 黃芩 甘草各五分

加味消毒飲

防風 荆芥 惡寒 甘草 連喬

擦面神丹

紫塊 野大黃四兩取汁 穿山甲十片燒存性 川椒末五錢 生姜三兩取汁和研生絹包擦如乾入醋潤濕數次如初 此方屢效

甘家方

水銀兩半 豬脂 搽令消盡入 黃礬石末二兩 胡粉一兩 再加豬脂令和如泥 洗瘡淨塗之別以胡粉塗膏上

通脉四逆湯

少陰

柏連散

總治 炙黃柏 黃連 炒胡粉 等分爲末 豬脂調塗 此治面上熱毒惡瘡

清上防風湯

又 防風一錢 連喬 白芷 桔梗各八分 酒黃芩 川芎各七分 酒黃連 荆芥



山梔 枳殼 薄荷各五分 甘草三分 此方崑清上焦火治頭面生瘡癩風熱毒

### 玉容散

皂角一斤 升麻二兩六錢半 楮寔二兩六錢半 白芷 白芨 天花粉 萊豆粉 各三錢三分半 糯米三合半 砂仁 白丁香各一錢六分半 一方加樟腦二錢 共為細末令勻常用洗面 一方野駱或生小瘡或生座拂粉刺此方崑治面上自然光澤

### 連翹散

連翹 川芎 白芷 片苓 桑白皮 黃連 沙參 荆芥 山梔 貝母 甘草各七分 水煎食後服 一名清肺散 此方崑治面生穀疔瘡俗名粉刺及面上肺火肺風瘡

### 紅玉散

白芷 藿香葉 牙皂各二錢 甘松 三奈子 木澤 白丁香 細辛 密陀僧 杏仁各一錢 天花粉 白茯苓各一錢半 樟腦五分 白芨三分 右共為細末臨臥時用津唾調或乳汁調敷面上明早用溫水洗去其面如玉 木澤未詳

明 堂 部 位



此方端治一切酒刺風刺黑黧斑子

自鼻直上髮際曰天中。天中之下曰天庭。即額也。天庭之下曰司空。司空之下曰印堂。在兩眉間。印堂之下曰山根。即兩眼之

額爲天庭屬心  
 頰爲地閣屬腎  
 鼻居面中屬脾  
 左頰屬肝右頰  
 屬肺此五臟部  
 位也察其色自  
 可以辨其病

間山根之下曰鼻準。卽明堂也。鼻準之下曰人中。人中之下曰承漿。承漿穴各承漿之下曰地閣。卽頰也。兩額角曰方廣。亦曰太陽穴。靈樞曰五色獨決于明堂。明堂者鼻也。明堂之色青黑爲痛。黃赤爲熱。白爲寒。又曰明堂者鼻也。闕者眉間也。庭者顏也。額蕃者頰側也。蔽者耳門也。其間欲方大。去之十步。皆見于外。如是者壽必百歲。又曰庭者額中也。闕中者兩眉之間也。下極者兩目之間也。直下者兩鼻而下也。方者鼻隧也。面王者鼻柱之端也。又曰明堂之色沉濁爲內。浮澤爲外。黃赤爲風。青黑爲痛。白爲寒。黃而膏潤爲膿。赤甚爲血。痛甚爲癰。寒甚爲皮不仁。五色各見其部。察其浮沉以知淺深。察其澤夭以觀成敗。又曰目赤色者病在心。白在肺。青在肝。黃在脾。黑在腎。黃色不可名者病在胸中。又曰視其顏色黃赤者多熱氣。青白者少熱氣。黑色

者多血少氣。內經曰：五臟六腑，固盡有部。視其五色，黃赤爲熱，白爲寒，青黑爲痛。此所謂視而可見者也。又曰：五臟已敗，其色必夭。天必死矣。註曰：天，謂死生異常之候也。色者，神之旗。臟者，神之舍。故神去則臟敗，臟敗則色見異常之候也。又曰：切脈動靜而視精明，察五色，觀五臟有餘不足，六腑強弱，形之盛衰，以此參互決死生之分。註云：精明，穴名，在明堂左右兩目內眥也。

綱目曰：自額而下關上，屬首咽喉之部分也。自關中循鼻而下鼻端，屬肺心肝脾腎五臟之部分也。自目內眥挾鼻而下至承漿，屬胆胃大小腸膀胱六腑之部分也。自顴而下頰，則屬肩臂手之部分也。自牙車而斜下頤，屬股膝脛足之部分也。內經曰：精明五色者，氣之華也。赤欲如帛裹朱，不欲如赭。白欲如翎羽，不欲如鹽。青欲如蒼璧之澤，不欲如藍。黃欲如羅裹雄黃。

不欲如黃土。黑欲如重漆色。不欲如炭。註云：精明穴名。五氣之精華者。上見爲五色。變化于精明之間也。又曰：五臟之氣。青如草滋者死。黃如枳實者死。黑如怡者死。赤如衄血者死。白如枯骨者死。此五色之見死也。青如翠羽者生。赤如鷄冠者生。黃如蟹腹者生。白如豕膏者生。黑如烏羽者生。此五色之見生也。又曰：生于心如以縞裹朱。生于肺如以縞裹紅。生于肝如以縞裹紺。生于脾如以縞裹瓜。萸寔生于腎。如以縞裹紫。此五臟所生之外榮也。又曰：夫心者五臟之專精也。目者其竅也。華色者其榮也。又曰：面黃目青。面黃目赤。面黃目白。面黃目黑。皆不死也。面青目赤。面赤目白。面青目黑。面黑目白。面赤目青。皆死也。華佗曰：病人面青目白者死。面青目黃者五日死。面赤目白者十日死。面赤目青者六日死。面黑目白者八日死。面白目黑者死。

面黑目直視惡風者死。赤色出兩額大如拇指者病雖少愈必卒死。又曰病人耳目及頰顴赤者死。黑色出于天庭天中者死。耳目鼻黑色起入口者死。面黑唇青者面青唇黑者亦死。扁鵲曰病人面眇白直視肩息者一日死。仲景曰鼻頭色青腹中痛舌冷者死。鼻頭色微黑者有水氣。色黃者胸上有寒。色白者亡血也。設微赤非時者死。色青爲痛。色黑爲勞。色赤爲風。色黃者便難也。色鮮明者有留飲也。丹溪曰人有病面上忽見紅點者多死。臍下忽大痛人中如墨色者多死。

面部諸瘍俱熱毒病也。雖各由于經絡大約陽明之症居多。如發眉生左右眉稜或頭或尾生瘍在眉頭則易攻入眼目在眉後則易攻入太陽最宜謹慎。或眉心生疽名面風毒由膀胱風熱壅結陰陽相滯所致。宜消毒散或而眉疔又名發眉毒寒熱先作或痒

或麻木然後色黑痛甚宜追疔奪命湯二活散然凡疔之發皆如此不獨在

眉也宜知之又如左右額赤疽夫額與太陽相近皆屬要害處若

額疽腫滿太陽即成虛損故始發時不拘大小急宜以藥貼破見

膿即無害破後尤宜速斂初起宜黃連消毒散仙方活命飲欬口宜外貼長肌膏倘外傷風

水即能殺人若七日刺不得膿十日不宥者死又如左右太陽穴

癰疽亦宜于五七日內破之宜追毒萬應針頭丸否則毒氣攻眼眼合不開

破更傷風水必傷目又如鼻柱上生疽乃肺經風熱及上焦鬱火

所成也宜漏蘆湯仙方活命飲加山梔木通薄荷又如鼻下人中兩傍及承漿生疽名

發髭此由摘髮風入孔竅而成也宜仙方活命飲又如地角上生疽名髭

毒由陽明風熱也宜仙方活命飲加山梔木通薄荷又如顴骨疽亦名面風毒

多由上焦陽明鬱火所致宜仙方活命飲加升麻桔梗而亦有由

干心病者靈樞曰心病者顴赤察其色赤且診其脉病果屬心則

急降心火。宜黃連安神丸清之有由于腎者。靈樞曰。腎病顴骨而黑。察其色

黑。且診其脉。病果屬腎。則急滋腎水。宜六味地黃丸固不得概泥為陽明

鬱火也。又如腮臉生毒。發于肌肉。浮而不着骨。此名疔腮。乃陽明

風熱相乘。或因積熱所致也。宜白芷胃風湯犀角升麻湯其間更自有辨。近于

下為發頤。由陽明畜熱。近于耳後。又屬少陽熱毒。上攻。宜急用仙

加元參。若老弱人。不可全用攻瀉。宜黃芪內托散至于腮頰上生瘡。亦屬

陽明熱症。宜仙方活命飲加桔梗升麻或犀角升麻湯又如遊風毒生于面上。亦陽明

胃病。由平日多食辛辣厚味。金石藥也。宜黃連消毒飲去人參加山柰薄荷葉又如

面上風癩。宜祛風白芷散及耳鼻面上。與下部諸竅生瘡。隨月盛衰。名月

蝕瘡。宜月蝕散眼胞上生瘡。名偷針眼。宜偷針眼方并小兒環口生瘡。

名羊鬚瘡。宜羊鬚散小兒面上耳後生瘡。多出水。名黃水瘡。宜藥油玉紅膏以

上皆面瘍之屬也。雖然。面生瘡疽。其斑痕一時不易。即退。宜用鮮



橄欖切斷。蘸麝香少許擦之。一二日即可無痕。此良法也。不然面留瘡疤。其何以使人見之哉。

面瘍症治 薛立齋曰。疔腮屬足陽明胃經內熱。癰痛宜升麻黃連湯。白芷胃風湯。外腫作痛。內熱口乾。犀角升麻湯。內傷寒涼不能消潰者。補中益氣湯。發熱作渴。大便秘者。加味清涼飲。表裡俱解而作腫痛者。欲成膿也。托裡消毒散。膿成托裡散。其氣虛血虛。倦怠惡食等症。照常用補中湯。六君子湯。十全大補湯。八珍湯。選用不可混于風熱用剋伐之劑。又曰。連耳上太陽部分屬風熱。加羌活防風。連耳下少陽部分屬怒火。加柴胡山梔丹皮。連耳後少陰部分屬相火。加知母黃柏。齒牙俱腫。出血者。清胃散加石膏。陳文治曰。凡腫初起。宜黃連消毒散。若腫硬作痛。繼以仙方活命飲。一二劑。脈數而濡。乃濕熱壅盛。故用

黃連消毒散。腫硬作痛。故用仙方活命飲。並以甘溫補益陽氣。托裡而潰腐之。不宜純用苦寒傷胃氣。反致不得腐化。凡瘡易消散。易腐潰。易收斂。皆氣血壯盛故也。可以類推。

治面部諸瘍方

消毒散

巨細 菘豆 五倍子 研末醋調搽

蟾酥丸

乳香 沒藥各二錢 輕粉 蟾酥各一錢 麝香五分 川烏 蓮鬚 硃砂各錢半

追疔奪命湯

重樓各七分 防風 澤蘭五分 青皮 金線 首烏 羌活 姜蚕 藕節各一錢 黃連 水煎臨臥入酒一杯服衣覆取汗 加大便秘 加大黃一錢

二活散

羌活 獨活 當歸 烏藥 赤芍 連 喬 酒洗金銀花 花粉 白芷 甘草節各 五錢 紅花 蘇木 荆芥 蟬退 葛根各 三錢 檀香 二錢 共為末每三錢用蒼耳子 煎湯調下

黃連消毒散

知母

黃連 羌活 黃芩 黃柏 生地  
獨活 防風 連翹 蘇木 防已

澤瀉

桔梗各五分 甘草各三分 水煎

此方專治一切瘰癧疽癩腫發痛或麻木誠瘡家  
初起通用之良方

仙方活命飲

草 歸尾 炒黃芽山甲 白芷 防風 赤芍 甘  
沒藥各一錢 花粉 貝母 皂角刺 乳香  
乳香沒藥二珠為末將水酒各半煎藥送下不  
飲酒水煎亦可

此方專治一切瘡瘍未成膿者自消已成膿者  
即潰止痛消毒誠瘡家初起通用之神方故以  
仙方活命呼之

長肌膏

蘇合 白蠟油四錢 黃蠟 香油各八錢  
大楓子去壳研五錢 番木鱉二錢 黃連

黃柏 枯礬 輕粉各三錢 密陀僧另研五  
分 將前七味先煎去渣入礬粉僧三味拌勻  
候凝着瘡口大小做薄餅替穿小孔十數貼瘡  
日易之益茶湯洗淨再貼  
此方兼治年久諸般爛瘡

追毒針頭丸

萬應 各三錢 麝香二錢 血竭 蟾酥 輕粉  
砂各三錢 全蝎 蜈蚣各一對 全用 片礬

漏蘆湯

一錢 煉蜜丸黍米大瘡頭用針挑破微有血  
出以藥一粒放進眼上用綿紙蓋之周圍以  
垂粘定不日愈  
兼治一切臍背惡瘡欲死一粒可愈

真麻 朴硝 大黃 各一錢 黃芩 漏蘆  
炙草 升麻 各五分 枳實 麩炒 白芍藥 白

飲 此方專治一切疔瘡毒初覺一二日如傷寒

頭痛煩渴拘急惡寒壯熱肢體疼痛恍惚悶亂

此方專治一切疔瘡毒初覺一二日如傷寒

頭痛煩渴拘急惡寒壯熱肢體疼痛恍惚悶亂

奪命丹

石 蜈蚣 三十一個 另研和藥末為丸菜豆大

錢 乾 加 好 酒 每 一 先 用 生 葱 白 三 四 根 嚼 爛 吐

如 乾 加 好 酒 每 一 先 用 生 葱 白 三 四 根 嚼 爛 吐

手 心 包 藥 熱 酒 連 葱 送 下 約 行 六 七 里 汗 出 為

效 重 者 再 服 一 二 丸

此方專主諸般大腫毒 此與前蟾酥丸皆少

陰經藥皆為劫劑用者當審陰陽輕重之分而

擇取之若些小症候勿用也

黃連安神丸

清心

六味地黃丸 地黃 山藥 山萸 丹皮 茯苓

白芷胃風湯 白芷 升麻各二錢半 葛根七分 當歸錢半 炙草一錢 柴胡

草豆蔻 黃柏 藜木 羌活各四分 蔓荊 子 姜蚕炒去絲各三分 麻黃去節六分

此方端治氣虛風熱面目麻木或牙關緊急眼目瞶動

犀角升麻湯 犀角錢半 升麻 防風 羌活 白附子 川芎 白芷 黃芩各五分 甘草二分

水煎服 此方端治胃經風毒血氣凝滯內熱口乾鼻額口唇頰車髮際連牙腫痛

黃芪內托散 黃芪 當歸 川芎 厚朴 桔梗 防風 甘草 人參 白芍各五分 肉桂三

祛風白芷散 白芷三錢 黃連 黃柏 黃丹各二錢 茯苓錢半 輕粉一錢 為末香油調搽

一方加兒茶二錢麝香二分

月蝕瘡散 月蝕藥 炒胡粉 枯礬 黃連 黃丹 輕粉各二錢 胭脂燒存性一錢 麝香一

共為末以鹽湯洗淨乾搽或油調敷

偷針眼方

針眼 南星 地黃各三錢研成膏貼太陽兩  
邊其腫自消

羊鬚散

羊鬚 荆芥 乾葱去核各二錢  
右燒炒存性入臘粉五分全研先洗淨香油  
調塗

藥油

黃水瘡 松香 枯礬 槐樹皮 共為末紙  
捲為筒藏藥在內蘸油燃火有油滴下收之入  
輕粉少許搽

玉紅膏

又用 香椒即川椒一兩另研末篩細  
兩用 好醋加葱頭打碎或取汁同煮 黃丹三  
兩 枯礬二兩半 輕粉七錢五分 共為末  
先以 猪肉湯洗淨菜油調塗

升麻黃連湯

各一錢 升麻 黃連 白芷 連喬 牛蒡子  
痛連太陽加羌活 當歸各錢半 水煎服 如  
此方專治胃經熱毒腮腫作痛 後加山梔柴胡

補中益氣湯

又 黃芪 升麻 柴胡 陳皮 甘草 人  
當歸 白木 參 麻 木 草 人

加味清涼飲

又 山梔 炒大黃 赤芍 當歸 甘草 黃芩

托裡消毒散

又人參 黃芪 鹽水炒 酒當歸 川芎  
炒白芍 炒白朮 茯苓 各一錢 金銀花  
白芷 各七分 炙草 連喬 各五分

薛立齋本方加減法開列于後

高腫微痛熱毒也加黃連  
漫腫微痛氣虛也去銀花連喬加參朮

頭痛發熱邪在表也加川芎羌活或去參芪芍  
木

外邪在表而元氣寔者暫用人參敗毒散即服  
本方

頭痛惡寒表虛也去銀花連喬加參芪

發熱飲冷便秘內熱也去參芪歸朮加大黃  
發熱飲熱便秘內虛也去銀花連喬加參芪歸

發熱飲冷小便澁滯汗熱也去參芪加柴胡山  
梔

不作膿膿不潰氣虛也去銀花連喬白芷加參  
朮肉桂如不應暫用十全大補湯再服此

腫赤作痛血凝滯也加乳香沒藥如不應暫用  
仙方活命飲再服本方

膿出反痛氣血虛也去銀花連喬白芷加參芪  
歸地

肉赤而不飲血虛有熱也去銀連芷加熟地丹  
皮參芪

肉熱而不斂陽氣虛寒也去參芪加白斂宮桂  
或肉桂

漫腫不痛或肉死不潰脾氣虛也去銀花連喬

加人參白朮如不應加姜桂更不應宜急加  
附子

肉白而不斂陽氣虛也去銀花連喬白芷加參

芪歸朮

膿多而不斂氣血虛去銀花連喬白芷加參芪  
歸朮熟地如不應暫用十全大補湯再服本

方自效

飲食少思而不斂胃氣虛也去銀連芷加參芪

如不應暫用補中益氣湯

飲食難化而不斂脾氣虛也去銀連芷加參朮

如不應暫用六君子湯又不應佐以八味丸

仍兼服本方

膿少而帶赤血虛也去銀連芷加參歸朮如不

應暫用八珍湯加丹皮

忿怒瞋熱而出血肝火血虛也去銀連芷加丹

皮熟地黑山梔如不應暫用八珍湯送六味

地黃丸

面青血脹而出血肝氣虛不能藏血也去銀連

芷加山黃五味子如不應兼用六味丸

食少體倦而出血脾氣虛而不能攝血也去銀

連芷加參芪歸地兼鬱少寐加茯神重仁遠



志龍眼內如不應暫用歸脾湯仍服此  
欲吐作嘔或外擦內服寒涼或痛甚或感寒邪

穢氣而嘔胃氣虛也去銀連芷加人參白木  
藿香

飲食少思腸鳴腹痛腹冷泄瀉脾氣虛寒也去  
銀連芷加炮姜木香

手足逆冷脾血虛寒也去銀連芷加炮姜木香  
附子煎送四神丸

竹葉黃芩湯  
竹葉黃芩湯  
竹葉黃芩湯  
竹葉黃芩湯  
竹葉黃芩湯  
竹葉黃芩湯  
竹葉黃芩湯  
竹葉黃芩湯  
竹葉黃芩湯  
竹葉黃芩湯

葉石膏湯  
葉石膏湯  
葉石膏湯  
葉石膏湯  
葉石膏湯  
葉石膏湯  
葉石膏湯  
葉石膏湯  
葉石膏湯  
葉石膏湯

膿多作渴氣血虛也去銀連芷加熟地五味子  
如不應暫用十全大補湯加麥冬五味

口乾舌燥腎氣虛也去銀連芷加熟地山藥山  
黃如不應兼用六味丸又不應佐以補中益

氣湯  
氣湯  
氣湯  
氣湯  
氣湯  
氣湯  
氣湯  
氣湯  
氣湯  
氣湯

自汗內熱口乾胃氣虛也去銀連芷加參芪歸  
朮如不應暫用六君子湯

盜汗內熱口乾陰血虛也去銀連芷加熟地麥  
冬五味如不應暫用當歸六黃湯

莖中痛而小便不利精內敗也去銀連芷加山  
黃止藥澤瀉如不應佐以六味丸

愈便則愈痛愈痛則愈便精後竭也去銀連芷

煎送六味丸

食少體倦口乾飲熱小便黃短脾肺虛熱也去

銀連芷加五味山萸如不應暫用六味丸

勞役而小便黃元氣下陷也去銀連芷加升麻

柴胡

午後小便黃短胃虛熱也去銀連芷加升麻柴

胡不應煎送六味丸

口燥作渴小便頻數腎水虧也去銀連芷加熟

地山萸山藥五味不應兼用六味丸

四肢逆冷腎氣虛寒也去銀連芷加附桂不應

佐以八味丸

食少體倦作渴胃氣虛也去銀連芷加參芪白

木不應暫用補中益氣湯

體倦頭痛或眩暈中氣虛也去銀連芷加升麻

柴胡不應暫用補中益氣湯加蔓荊子

日瞞頭或眩暈陰血虛也去銀連芷加熟地不

應佐以六味丸

夢泄遺精頭眩頭痛或痰喘氣促腎虛不能納

氣也去銀連芎芷佐以六味丸如不應是虛

寒也用八味丸面赤煩熱作渴脉大而

虛血脫煩躁也去銀連芷加黃芪當歸不應

暫用當歸補血湯

身熱惡寒欲投于水脉沉微細氣脫發躁也去

銀連芷加附桂不應暫用附子理中湯

多思不寐體痛盜汗脾血虛也去銀連芷加茯

神遠志杏仁圓眼不應暫用歸脾湯

寢汗出腎氣虛也去銀連芷加五味子煎送六

味丸

飲食時出汗胃氣虛也去三味加參芪歸朮五

睡後覺飽出盜汗宿食也去三味加參朮半夏

不應暫用六君子湯

胸滿多痰脾氣虛也去三味加桔梗半夏不應

暫用六君子湯加桔梗枳殼

肺熱多痰脾血虛也去三味加歸地參朮不應

暫用六君子湯加芍歸熟地

咳嗽垂痰腎虧津液泛上也去三味加熟地山

藥山更不應任以六味丸

急怒胸痞肝氣滯也加桔梗山柅不應暫用補

中益氣湯加桔梗枳殼

倦忘胸痞中氣虛也去三味加參朮茯苓不應

暫用八珍湯加柴胡

口苦寒熱往來肝火血虛也去三味加柴胡熟

地

因怒寒熱往來肝火血虛也加柴芩不應暫用

八珍湯加山柅炒杏仁酒龍胆草

體倦寒熱往來肝脾氣滯也去三味加參芪歸

朮不應暫用補中益氣湯

木

內熱嗜熱或寒熱往來陰血虛也去三味加芍

歸柴胡丹皮不應暫用入珍湯加丹皮

畏寒或寒熱往來胃氣虛也去三味加參苓白

朮升麻不應暫用補中益氣湯

脇痛痞滿或寒熱往來肝氣滯也去三味加青

皮木香不應氣血虛也更加芍歸參朮

婦人勞役恚恚或適經行發熱詰語或夜熱甚

此邪在血分也去三味加生地柴胡丹皮不

應暫用加味四物湯

誤服剋伐藥或膿血太泄或因吐瀉或誤入房

或勞損元氣或夢洩遺精或外邪感觸以致

發熱頭痛小便淋瀝或滑數便血日赤煩喘

氣短頭暈體倦熱渴意欲投冰身熱惡衣揚

手癱足廢背反張鼻聲自汗此陽氣厥陷之

假熱症也

畏寒頭痛咳逆嘔吐耳曠目矇小便自遺為利

腸鳴理急腹痛玉莖短縮牙齒浮痛肢體麻

痺或厥冷身痛或咬牙齧唇此陽氣脫陷之

真寒症也 以上假熱真寒勿論其脈勿論

其症但有一二急去三味加桂附補之應有

復生之理 又按加減六十二法皆托裡消

毒之發揮也 卽此意而消息則得瘍家之要

矣他如護心散十方皆有益無損之藥故能

托裡消毒故附錄于後在臨宜取舍而已

藜心散 菜豆末一兩 乳香五錢 每末一

錢食後用生甘草湯調細呷下使常在隔間

為妙 李氏云凡患瘡疽蚤進護心散數服

使毒氣吐出而無嘔吐之患否則咽喉口舌

生瘡或黑爛如菌苦澀發四五日後宜問別

藥而服但此方端解金石發疽之品若發熱

嫩脾飲冷而渴必宜用也若不喜飲冷而喜

熱湯及非因丹毒而發症者則又不宜用

阿膠飲子 橘紅五錢 阿膠蛤粉炒 粉草

各一兩 分三劑水煎服 此方端治一切

瘡疽癰毒 國老膏 粉草不拘多少河水浸二日揉汁砂

器內煎膏每一二匙酒或白湯下 此方端

治一切瘡疽消腫逐毒更解丹毒功難盡述

但元氣虛弱者忌 萬金散 瓜蔓一个研細 沒藥一錢研末

甘草節二錢 先將二味酒煎入沒藥末調

服 此方端治瘡疽已潰未潰有消毒破血

之功 忍冬酒 忍冬藤生取五兩 甘草一兩 水

煎至半入好酒一碗再煎數沸去渣分三服

一日夜服完重者連服二劑至大小便通利

為良 此方治一切瘡疽初起甚效 沒藥二錢

保安湯 括蕒新者一个去皮焙 沒藥二錢

研末 金銀花 生薑各五錢 好酒五大

碗砂器 內煎三茶 杯分三次服 毒微者一服

即效 此方治瘡疽托裡已成者速潰

紫金錠 五倍子三兩 打碎洗淨焙乾 山茨

菇二兩 去皮研末 麝香三錢 另研 干金

子淨霜 大戟去芦 焙為末 各一兩 糯米

濃飲丸為四十錠 此藥能應諸病 各有神效

若瘡疽用東流水磨塗 并服須端午日合一

方有全蝎 殊砂雄黃各一兩 各神仙追毒丸

服此 凡一切瘡疽惡瘡湯火虫蛇犬獸傷俱宜

單煮大黃湯 大黃酒浸去皮水煎服 此藥

真人傳比瘡疽熱毒大便秘結者服此能宜

棟子灰 川棟子燒灰存性 酒服次用十四枚

次用二十一枚 如此三服 雖成亦小 此方

端治諸毒初起 冬瓜一個 切去一頭 合搗上瓜爛

拔毒仙丹 合之瓜未完而瘡愈 此方能治背

發欲死 鷺按托裡消毒散及護心散以下十方俱治一

切瘡疽瘡瘍惡症不獨面部疔腫用之也特首

見于此故詳錄之 凡臨一切症者酌取可也

托裡散

又 大黃 牡蠣 瓜蒌根 朴硝 連翹  
皂角刺各三錢 赤芍 黃芩各二錢 金銀  
花 當歸各錢半 每末五錢水酒煎服  
此方兼治一切惡瘡癰腫便毒始發脈洪弦是  
而致腫甚者三服見效

補中湯

又

六君子湯

又

十全大補湯

又

八珍湯

又

清胃散

又

又 人參 茯苓 白朮 甘草 地黃 川  
芎 歸身 白芍 黃連 丹皮各錢半 升  
麻三錢 石膏二錢 細辛三分 黃芩一錢

目病源流 眉發骨

沈金鰲撰

肝發竅于目。故目病多由于肝。目又爲五臟精華。故其地位亦分隸臟腑。何言之。目有五輪。白珠屬肺。肺主氣。氣之精曰氣輪。烏珠屬肝。肝主筋。筋之精曰風輪。肝爲風也。內外眥屬心。心主血。血之精曰血輪。上下胞屬脾。脾主肌肉。肉之精曰肉輪。瞳人屬腎。腎主骨。骨之精曰水輪。腎爲水也。得效曰氣輪之病。因凌寒。盲。暑。愛飲寒漿。肌體虛疎。寒邪入內。其候或痛或昏。傳在白睛。筋多腫赤。視日如隔霧。着物似生烟。日久不治。變成白膜。黑暗難開。風輪之病。因喜怒不常。作勞用心。晝視遠物。夜讀細書。其候眥頭尤澁。睛內偏疼。視物不明。胞弦緊急。宜去風藥。肉輪之病。因多食熱物。五辛。這道奔馳。食飽耽眠。風積痰壅。胞多赤腫。昏蒙多淚。倒睫澁痛。瘀血侵睛。宜醒脾藥。血輪之病。因七情煩勞。內動于心。外攻于目。其



候赤筋纏眚。白膜侵睛。胞腫難開昏澁。久不治。失明。宜洗心涼血藥。水輪之病。因勞役過度。嗜慾無厭。又傷七情。多食酒麪辛熱。因動腎經。逆于黑水。其候冷淚流于臉上。飛蠅趁于睛前。或澁或痒。結成翳障。常帶昏暗。宜補腎藥。目又有八廓。乾天廓屬肺。位睛中間。坎水廓屬腎。位瞳人。艮山廓屬胆。位神光。震雷廓屬小腸。位白睛上。截向小眚。巽風廓屬肝。位烏珠。離火廓屬心。位大小眚。坤地廓屬脾胃。位上下胞。兌澤廓屬膀胱。位白睛下。截向大眚。得效曰。天廓之病。因雲中射雁。月下看書。侵冒寒暑。其候視物生烟。眚疼難間。地廓之病。因濕積頭上。冷灌睛輪。其候眼弦緊急。瘀血生瘡。火廓之病。因心恐神怖。赤脉侵眚。血灌瞳人。其候眦頭紅赤而腫。睛內偏疼。熱淚如注。水廓之病。因努力爭鬪。擊棒開弓。驟騎努力。其候常多昏暗。睛弦淚多。風廓之病。因枕邊窻穴。有風不避。腦中

風邪其候黑睛多痒兩瞼常爛或昏多淚雷廓之病因失枕睡臥酒後行房血脉滿溢風邪內聚其候皆頭赤腫瞼內生瘡倒睫拳毛攀睛努肉山廓之病因撞刺益損致令肉生兩瞼瞽閉雙睛若不早治必致昏暗瘀血侵睛澤廓之病因春不宜解冬聚湯毒多食辛熱致令腦脂凝聚血淚漸流有如霧障目又有內外眥俗云眼大頭爲內眥太陽經脉所起也血多氣少俗云眼梢頭爲銳眥卽外眥少陽經也血少氣多目上綱亦屬太陽目下綱陽明也血氣俱多此是三陽經俱會于目惟厥陰肝經連於目系而已故張子和云血太過者太陽陽明之寔也血不及者厥陰之虛也故出血者宜太陽陽明以此二經血多故也少陽一經不宜出血血少故也刺太陽陽明出血則目愈明刺少陽出血則目愈昏矣此五輪八廓內外眥之分配臟腑而目之爲病所以不止由于肝也然

其部位雖各分屬而病之發于臟腑又統全局言之不必細分其

部也。試觀肺經壅熱則病白睛腫赤。宜桑皮湯心火上炎則病目赤而

寸脉數。宜導赤散清火止痛湯脾胃不足則病內障耳鳴及多年目昏不能

視物。宜益氣聰明湯腎水不足則病視不分明漸成內障。宜熟地黃丸肝血不

足則病目昏生花久視無力多眵。宜養肝丸與夫肝火盛則病目赤澁

痛。宜龍管丸四龍胆湯肝經熱邪上壅則病目暴赤澁而腫痛。宜湯散肝經

積熱肺受風邪則病眼障昏花。宜還睛丸如此等症雖亦有現于本經

之部位者然總不能盡拘矣。至病之所發寔有見于各經之部位

者又當隨各經治之。如白睛變赤為火乘肺也。上下胞赤腫為火

乘脾也。五色花管遮瞳子為腎虛也。睛被管遮為肝虛火旺也。目

中血貫澁火自甚也。蓋以目之為病皆屬于火斷無由于寒者。故

既見于各經宜用各經藥以瀉之也。雖然目病大綱約有三端一

爲內障。總係足厥陰肝疾。亦有由腎虛者。蓋通黑睛之脈者曰目系。而目系則屬足厥陰。足太陽手少陽三經三經虛邪從目系入黑睛內爲醫。故內障爲肝疾兼腎心則肝腎之主也。其症每先患一眼。漸及兩眼。皆黑睛內有隱隱青白。醫遮瞳人不痛不痒。無淚無眵。如薄霧如輕烟。或如金色。或如菘豆色。或見五花。日漸日增。比外障更難療治。其屬肝者必由血少神勞。宜養肝丸生熱地黃丸其屬腎者必由內傷色慾。宜益陰腎氣丸滋腎明目丸其肝腎俱病者必由二經皆虛。宜駐景丸加減駐景丸此則通治內障之法也。而其症狀寔各有名目。共二十三種。今詳考眼科家書撮其要畧如一日圓醫。在黑珠上一點。圓日中見之。差小陰處見之。卽大視物不明。轉見黑花。此由肝腎兩虛而得也。宜補肝散補腎元二日水醫。如水束堅寔。傍觀目透于瞳人內。陰處及日中見之。其形一般。疼而淚出。此肝膽病也。宜通肝散三日

滑腎。有水銀珠子。但微含黃色。不疼下痛。無淚。遮蔽瞳人。宜菊散

四曰瀉腎。微如赤色。或聚或開。兩傍微光。瞳人上如凝脂色。無淚。

時瀉痛。宜決明子散 五曰散腎。形如鱗點。或驗下生粟。日夜痛楚。瞳人

最疼。常下熱淚。此瀉散二症。皆肝肺相傳也。宜八味還睛散 六曰橫開腎。

上橫如劍脊。下微薄不赤不痛。此病稀少。七日浮腎。上如水光白

色。環遮瞳人。生自小眦。頭至黑珠。上不痛不痒。無血色。相潮。八曰

沉腎。白點藏在黑珠下。向日細視。方見其白。睛疼痛。日輕夜重。聞

或出淚。宜空青丸 九曰偃月腎。膜如凝脂。一邊厚一邊薄。如缺月。其色

光白無瑕。此橫開浮沉偃月四症。皆難治。十日莖花腎。周回如

錐齒。四五枚相合。赤色刺痛如針。視物如烟。晝則痛楚。多淚昏暗。

十一曰黃心腎。四邊白。中一點黃。在黑珠上。時下澁淚。此莖花黃

心兩症。皆由肝肺風熱。宜還睛散 十二曰黑花腎。其狀青色。大小

皆頭澁痛常淚口苦此膽受風寒也。宜涼十三曰胎患初生觀物

轉睛不快至四五歲瞳人潔白昏蒙不見及年高不治此由胎中

受熱致損也十四曰五風五色變為內障頭痛甚却無淚日中如

坐暗室常自憂嘆此由毒風腦熱所致十五曰雷頭風此毒熱之

氣冲入眼睛中牽引瞳人或微或大或小黑暗全不見物十六曰

驚振因病中再被撞打變成內障日夜疼痛不能視三光此胎患

五風雷頭驚振四症俱不可治。俱宜八味十七曰綠風初患頭旋

額角相牽瞳人連鼻皆痛或時紅白花起肝受熱則先左肺受熱

則先右肝肺同病則齊發。宜先服羚羊角散十八曰烏風眼雖

痒痛而頭不旋但漸昏如物遮全無障腎或時生花此肝有寔熱

也。宜瀉十九曰黑風與綠風相似但時時黑花起此腎受風邪熱

攻于眼也須涼腎二十曰青風不痛不痒瞳人依然如無恙者但

微頭旋及生花轉加昏蒙此黑風青風相似俱宜還睛丸二十一曰肝

虛雀目雀目者日落即不見物也此由肝虛血少時時花起或時

頭痛久則雙目盲此則有初時好眼患成雀目者而亦有生成如

此并由父母遺體日落即不見物不必治治亦無效宜雀目散鮮地黃炒豬肝

妙食亦小兒每因疳病得之宜蛤粉丸風疳丸二十二曰高風雀目與前症

相同晝明晦暗但經年瞳子如金色名曰黃風不治宜還睛丸二十三

曰肝虛目暗遠視不明眼花頻起皆目赤痛有時看一成二此宜

與眼暗參看宜補肝散一為外障總係足三陽病按綱目本靈樞經曰

凡赤脉腎初從上而下屬太陽主表必冒稜骨痛或腦項痛或半

邊頭腫痛治法必當溫之宜蠟茶飲散之宜夏枯草散赤脉腎初從下而上

或從內眥出外皆屬陽明主裡其症多熱或便寔治法當下之宜

目流寒之宜羊角元一赤脉腎初從外眥入內屬少陽主半表半

氣飲宜黃連飲

裡治法宜和解之。宜神仙退昏丸綱目條析三陽是已而又皆統于肺以

外障皆連遮白睛而白睛則屬肺此則通治外障之法也而其症

狀亦各有名目共二十七款今復詳攷眼科家書撮其要畧如一

曰混睛白睛先赤後痒痛閉澁淚下久則睛變碧色滿目如凝脂

赤脉橫貫。宜地黃散二曰弩肉攀睛必眼先赤爛多年時痒時痛兩眦

頭弩出筋膜心氣不寧憂慮不已遂成攀睛或由用力作勞而得

或由風熱冲肝而成。俱宜二黃散定心元或由心經寔熱必大眦赤紅肉堆

起或由心經虛熱必小眦赤紅絲血脹。俱宜速效散三曰兩眦粘睛即

爛莖風也由風沿眼系上膈有積熱或飲食時挾怒氣而成久則

眼沿因膿漬而腫。宜還睛紫金丹點之甚則中生細虫年久不愈而多痒者

是也當去虫以絕根。宜聖草散亦有小兒初生即兩目赤而眦爛至三

四歲不愈者。宜桑皮湯送消風散四曰鷄冠蜆肉由風熱乘于脾經後有所



傳致醫生驗肉如鷄冠如蜆肉或青或黑阻碍痛楚怕日羞明須  
翻出看之用燈草輕輕刮去毫厘血出用銀匙挑洗風毒藥水按  
止之并不時將藥水點入則不復腫然後服藥宜石決明散五日驗生  
風粟由肝壅瘀血致兩臉上下初生如粟米漸大如米粒或赤或  
白不甚痛痒常淚出滲痛當翻出以針撥之兼服藥以宣其風熱  
宜消亦有由脾經積熱者須分別治之宜加味荆黃湯六日胞肉膠凝由  
風毒所注或熱積脾經或過于傷胞故上下胞腫如桃時出熱淚  
宜消風散羚羊角散七日漏睛膿出由心氣不寧風熱客于眦驗間致背頭  
結聚津液膿出不止宜白微元或因患瘡出膿血後大背頭常出膿涎  
不早治必生黑點侵損于目宜黃芪散八日風牽臉出由脾受風毒侵  
及于目故上下臉俱赤或翻出一臉在外若久而臉內俱赤則不  
治宜五退散九日臉硬睛疼臉中紅而堅硬疼痛涎出怕日羞明宜通肝散

亦有起腎障

宜春膏點之

十日蟹睛疼痛由肝家積熱上冲于目令目

痛甚黑睛上生黑子如蟹目或大如豆名曰損腎極難治

宜石决明散於

羊角

十一日睛高突起由風熱痰飲漬于臟腑蘊積生熱熱冲于

目致眼珠突出是名睛脹須用涼藥瀉肝

宜瀉肝散

一說云黑睛脹當

瀉肝

宜龍胆散

白睛脹當治肺

宜清肺散

存叅十二日血灌瞳人由肝氣閉

塞血無所歸致灌于瞳人痛如針刺視物不明却無腎膜

宜通血

散又恐生花須預防之

服前藥後再服還睛散

倘生腎障不可輕忽急早治

之宜鮮地黃汁和大黃末攤帛上二寸許覆眼上久則易之

十三日痛如針刺由熱毒在心忽

然睛急疼痛如針刺坐卧不寧

宜先服洗心散再服還睛散

十四日瞳人乾缺

眼睛乾澁全無淚流始而痛後稍定或白或黑不能見物不可治

十五日轉轆轉開睛藏上下瞼不能歸中也亦不易療姑服藥以

治之然不能决其必效也

宜瀉肝散

若風寒直灌瞳人攻于眼帶

則瞳人牽曳向下名墜睛眼亦轉轉關之類若日久卽拽破瞳

人兩眼俱陷卽不見物宜犀角散十六日風起喎偏由偏風牽引雙目

喎斜頻淚無腎不痒不痛宜蟬花無比散至如眼有偏視者由風邪攻肝

牽引瞳人故令偏視也宜槐子丸十七日鶻眼凝睛輪硬而不能轉動

者是也此不可治十八日神崇疼痛本無根因忽然疼痛如針刺

如火灸兩太陽牽痛日輕夜重先當求禱再服藥宜石決明散十九日

風赤瘡疾由脾藏風熱蘊結兩瞼似朱塗而生瘡黑睛端然無染

不治便生翳膜宜五退散外以湯泡散洗之二十日小眥赤脈由三焦積熱令

小眥中生赤脈漸漸冲睛急當早治并忌食熱物及房事宜犀角飲二

十一日拳毛倒睫由內多伏熱致陰氣外行故始則兩目緊急皮

縮漸生翳膜淚出涔涔睫倒難開瞳人如刺須先去其內熱及火

邪宜先服瀉肝散再服五退散使眼皮緩則毛自出腎自退或摘去拳毛用風

子血點眼內數次即愈。一法用木髓子一个去壳打爛綿裹塞鼻

中。左目塞右右目塞左。一二夜其曉即正。二十二日衝風淚出肺

虛遇風風衝于內火發于外風熱相搏遂至淚流不止。冬月尤甚。

宜白姜亦有汗熱甚而淚流并兩臉赤者。宜食後吞當歸盧薈丸亦有肝虛

客熱而迎風冷淚者。宜木二十三曰痒極難當由膽受風熱致瞳

子及背頭皆痒不能收瞼。宜驪風二十四曰天行赤目由天行時

疾目忽腫赤痛澁長幼相似。宜瀉肝散石决明散二十五曰被物

撞打目因撞打疼腫人被驚昏暗眼瞇停留瘀血。宜石决明散

若撞打睛出而目系未斷即推入瞼內勿驚觸四畔。宜生地黄散

爛厚如目系斷睛損不可治。其有瘀血者以針刺出且用眼藥二

十六日塵絲眯目或為飛絲所侵或為塵沙所苦皆疼痛閉澁眯

眼不脫。宜瞿麥散二十七曰偷針眼或太陽結熱或脾家積熱兼宿食

不消令目眥生小泡如瘡以針刺破即差甚有發腫而痛者用生  
南星生地黄同研膏貼兩太陽穴腫自消一為腎膜總係肝受風  
熱成病輕則朦朧重則厚起直指云腎雖自熱生然治之必先退  
腎而後退熱以先去熱則血冷而腎不能去也旨哉斯言其可知  
治腎之法乎至如勞役過度亦生腎當以補元為主宜益本滋腎丸服涼  
藥過多亦生腎蓋緣陽氣衰九竅不宜故青白腎見大眥也當益  
火之源以消陰腎宜補陽湯痲痘後亦生腎宜夾明元風熱眼病後亦生腎  
宜蟬花散菊花散 腎之由來良非一端然總論之不外肝氣盛而發現在  
表故始治之法只宜表散宜羌活退腎湯如反疏利邪必內陷而腎益深  
矣故凡邪氣未定謂之熱腎而浮邪氣已定謂之水腎而沉宜羚羊散  
散邪氣牢而深謂之陷腎當先熾發之宜羚羊散使邪氣再動腎再  
浮乃用退腎之劑宜神仙退雲丸大約腎係久病治之亦不能速效故須

積歲月除之。若眼睛上但有物如蠅翅之薄，則謂之膚瞖。此瞖之

輕者也。用點藥卽愈。宜烏賊骨散此皆通治瞖膜之法也。而其症狀亦

各有名目。共一十四條。今更詳考眼科家書撮其要略。如一日肝

臟積熱。先患赤腫疼痛。怕日羞明。淚溢難開。忽生瞖膜。初患一目。

漸及兩眼。宜洗肝散亦有由風熱相侵者。大約風眼腫則軟。熱眼

腫則硬。宜局方蜜蒙花散二曰膜入水輪。因黑珠上生瘡稍安。其痕不沒。

故侵入水輪。此難治。三曰釘瞖根深。由心肝留熱。致目疼生瞖。久

則如銀釘頭入黑睛。不可治。宜石決明散點之四曰黑瞖如珠。由腎虛受

風熱而得。如小黑豆。生黑睛上。疼痛淚出。不可用點藥。宜先服羚羊角散

服補五曰花瞖白陷。由肝肺二臟積熱。致睛上忽生白瞖。如花白

如鱗砌。宜先點磨瞖膏再服羚羊角散。六曰水瑕深瞖。由五臟俱受熱。致黑水內

橫深瑕。盤青色深入。痛楚無時。宜清涼散七曰玉瞖浮滿。黑珠上浮。玉

色不疼痛。腎根下紅粒。宜龍胆散八曰順逆生腎。凡腎自下而上

者為順。自上而下者為逆。順則易愈。逆則難治。宜車前散九曰旋

螺尖起。目痛。腎生尖起而赤。一似旋螺。宜先服通肝散十曰撞刺

生腎。因撞刺傷目生腎也。或兼風熱。更加疼痛昏暗。宜先服輕效

散。十一曰赤眼後生腎。由暴赤後熱流于肺。輕則朦朧。重則白睛

紅花。乃生雲膜。極不易治。宜服瀉肝散十二曰暴風客熱。由暴風

熱所攻。白睛起脹。漸覆黑珠。驗腫痒痛。宜瀉肝散十三曰黃膜上

衝。由脾受風熱毒。致黃膜從下生而上衝。黑暗疼痛。閉澁。此猶可

治。宜犀角飲十四曰赤膜下垂。由客邪所攻。致赤膜從上生而下遮黑

睛。名垂簾膜。迎風出淚。怕日羞明。此為難治。宜通肝散觀音夢授

以上論內障外障。腎膜皆目病所當縷析者。此外又有眼昏眼花

眼疼。三端各有由來。不可不察。蓋眼昏者。視物不明也。內經曰。肝

虛則目眈眈無所見。靈樞曰：足少陰之脈病，目眈眈無所見。又曰：氣脫者，目不明。難經曰：脫陰者，目盲。據諸經之言，是目昏皆由于虛。以五臟精皆聚于目，每一臟虛，則一臟精明之用失，故皆能令目昏。此則其原也。然亦有由于目之元府受熱者。河間云：熱氣怫鬱元府，閉塞而致氣液血脈榮衛精神不能升降出入，各隨所鬱微甚而為病之重輕。故熱鬱于目，則目無所見也。或目昏而見黑花，由熱氣甚也。據此可知，目昏不但為虛，而亦由熱矣。試觀傷寒症，熱極則目盲不識人，且有病後餘熱未清，并有目昏漸生，腎膜者。宜石決明散益可信也。若微昏者，至近則視難辨物，以近則尤反隔也。目暴不見物者，氣脫也。久病昏暗者，腎臟真陰虛也。總治宜駐景丸加減婦人目昏者，多由于鬱怒傷肝也。宜抑青明目湯。老人眼昏者，血氣衰而肝葉薄，膽汁減也。前人云：童子水在上，故視明瞭。



老人火在上故視昏暗宜夜光育神丸眼花者眼光昏

散也皆由腎虛之故蓋腎主骨骨之精為瞳子腎水虛骨枯火得

乘之故瞳子散而視物杳冥也如見黑花或如飛蠅散亂或如懸

蟻空虛皆腎虛也見青花膽虛也見紅花火甚也見五色花腎虛

客熱也東垣云陽主散陽虛則眼楞急而為倒睫拳毛陰主斂陰

虛不斂則瞳子散大而為目暗眼花然則昏花二症舍陰虛其安

屬哉宜滋陰地黃丸眼疼者一為目眚白眼疼即經言白眼赤脉

法于陽是也惟其屬陽故日中更疼點苦寒藥則效一為目珠黑

眼疼即經言瞳子黑眼法于陰是也惟其屬陰故夜則更疼點苦

寒藥反劇何相反若是歟蓋以白眼疼由肝寔熱宜鶴青丸黑眼

疼由肝虛熱故也宜夏枯草散至若男子讀書過度女子針綉太甚以

至眼疼發澁此為肝勞過度不必服藥時常閉目調養自愈以上

三端。又于內外障翳膜之外。所當詳審而析治者也。總之目為肝  
 臟發竅。而肝寔藏血。肝又主風。故目病多半由于虛寔寒熱及內  
 動外感之風邪。前既歷詳各種各目症治。茲更寔指其由以明病  
 所從發。如由血虛必目昏也。宜明目地黄丸由亡血過多及久痛傷血。或  
 年老血少。必羞明酸痛。不能視物也。宜芎歸明目丸或雖養血安神。必兩  
 目昏花。不能久視也。宜久患目疾方失血後復受燥熱。左目赤痛也。宜葉氏  
葉湯。高年血絡空虛。目昏日久。復又氣血乘其空隙。攻觸脈絡。液盡  
 而痛。當夜而甚。乃熱氣由陰而上也。宜葉氏羚羊湯寔熱暴發。必赤腫  
 疼痛也。宜瀉熱黃連湯風熱攻目。至隱澁難開也。宜羞明立勝散風熱壅珠。必眼  
 白紅障而痛也。宜黃連湯風熱牽閉。目不得開也。宜芎芷香蘇散風濕  
 上鬱。目赤。脉左弦。當以辛散也。宜葉氏夏枯草湯秋風化燥。上焦受邪。目  
 赤珠痛也。宜葉氏連喬湯熱蒸濕鬱。暑入氣阻。當用淡滲以清中上之邪。

也。宜葉氏鬱勃氣火。醫遮目睛也。宜葉氏山或陰血虛而陽氣盛。

能遠視不能近視也。宜地芝丸陽氣虛而陰血盛能近視不能遠視也。

宜定志丸陽升不交于陰。竟夕無寐而目珠赤痛也。宜葉氏陰傷

火鬱左眼眵疼痛。或微寒汗大出不可作時邪治也。宜六味丸去

子丹皮。或肺有寔熱而眵多結硬。肺有虛熱而眵稀不結也。宜經

邪中腦項之精。精散視岐見一為兩也。宜驪風一字散肝腎虛而視一為

兩也。宜腎氣丸肝胆氣熱而目痛偏左。腎膜紅絲脉左弦澁也。宜葉氏

湯陽明空虛肝陽上擾而右目多淚。皆脹心嘈雜當調補肝胃也。

宜葉氏肝陰內虧。厥陽上越左目痛。腎膜淚熱而脉細澁也。宜葉

湯焦煩鬱勃陽升化風。劫傷血液而左偏頭痛。先損左目致瞳人

散大也。宜葉氏肝時行火邪兩目腫痛也。宜白蒺藜湯種種目疾安可

不詳求治法哉。總之暴病皆是風火為災。宜羌柴湯外以久病則

洗眼湯洗之

皆為虛候。必須壯水滋陰。宜加味地黃丸。明目四神丸。或有過服寒涼以致陽虛。其火轉甚者。則當用溫補。其火自降。目自明矣。宜八味丸。加目疾藥。凡患目疾。切忌以冰片辛香金石等藥搽點。俗語云。眼不醫不瞎。蓋謂此也。此篇叅取危達齋得效方。

脈法 醫鑑曰。左寸脈洪數。心火炎也。關弦而洪。肝火盛也。右寸關俱弦而洪。肝木挾相火之勢。侮肺金而乘脾土也。回春曰。眼本火病。心肝數洪。右寸關見相火上冲。類聚曰。眼見黑花者。從腎虛而起。左手尺脈沉而數者。是也。

眼病皆火無寒。直指曰。凡眼為患。多生于熱。治法以清心涼肝。調血順氣為先耳。入門曰。歷攷眼科之病。無寒而有虛與熱。豈寒澁血而不上攻歟。

自得血而能視。內經曰。人卧則血歸于肝。肝受血而能視。又

曰。肝虛則目眈眈無所見。難經曰。肝氣通于目。肝和則能變五色。直指曰。肝者。目之外候。肝取木。腎取水。水能生木。子母相合。故肝腎之氣充。則精彩光明。肝腎之氣乏。則昏蒙暈眩。心者神之舍。又所以爲肝腎之綱焉。蓋心主血。肝藏血。血能熱。凡熱冲發于眼。皆當清心涼肝。入門曰。肝藏血。熱則目赤而腫。虛則眼前生花。

目病原由症治 東垣曰。因心事煩冗。飲食失節。勞役過度。故脾胃虛弱。心火太甚。則百脈沸騰。血脈逆行。邪害孔竅。故日月不明。脾者。諸陰之首。目者。血脈之宗。故脾虛則五臟精氣皆失。所司不能歸明于目矣。心者。君火也。主人之神。宜靜而安。相火代行其令。相火者。包絡也。主百脈皆榮于目。既勞役運動。損其血脈。故百病生焉。不理脾胃。及養血安神。是治其標。不治其本。

不明此理也。入門曰：五臟六腑精華皆稟于脾。注于目。故理脾胃則氣上升而神清也。肝之系雖連于目而照徹光彩寔腎精心神所主。故補精安神治眼之本也。又曰：內障昏蒙因腦脂下凝烏珠轉白如腦脂凝結。瞳人反背者不治。丹溪曰：凡昏弱不能視物。內障見黑花。瞳子散大皆裡病也。又曰：目疾所因不過虛寔。虛者昏花由腎經真水之微也。寔者瞳痛由肝經風熱之甚也。若虛實相因則兼用滋陰散熱此內治法也。至日久熱壅血凝而爲攀睛弩肉。瞖膜赤爛等則必須點洗外治之法。正傳曰：雀目病暮暗者肝虛無血也。至曉復明者木生于亥旺于卯。絕于申酉戌木氣衰故暗。至卯木氣盛故復明。至雀目終變爲黃脹而死者木絕于申乃水土長生之地木衰而土盛始變爲黃脹。宜平胃散以平土氣。四物湯以補肝虛。保命日

目病在腑爲表。當除風散熱。在臟爲裡。當養血安神。

目病易治。難治不治。及凶症。內經曰。瞳子高者。太陽不足。戴眼者。太陽已絕。此決死生之要。不可以不察也。又曰。目內陷者。太陽絕也。死。保命曰。外障易治。內障難治。暴發爲表。易治。久病爲裡。難治。直指曰。真珠翳狀如碎米者。易散。梅花翳狀如梅花者。難消。入門曰。瞳人乾缺。痛澁無淚者。或白翳藏在黑水下。向日細看方見者。或兩眼相傳疼痛。晝輕夜重者。或內障五色相間。頭痛無淚。日中如坐暗室者。或雷頭風熱毒氣冲入睛中。或微或大。昏暗不見者。皆不治。綱目曰。戴眼者。目直視。而目睛不轉動也。若目睛動者。非直視也。傷寒直視者。邪氣壅盛。臟腑之氣不上榮于目。則直視。多難治。衄家不可發汗。發汗則目直視。不能瞬。不能眠。未甚也。迨狂言反目直視。與直視。

搖頭皆臟腑氣奪絕也卽死。

目病導引法 保生秘要曰對香靜坐灰心歇念目含光意覺香頭有灰以意吹之又靜覺灰又吹香盡爲期治一切雲瞤弩肉扳睛腎水枯心火盛皆效。

運功 保生秘要曰法行良背右旋上行逾崑崙經明堂漸旋至眼細圈入瞳人撤散數十度降胸臆曲行大腸出穀道退火復歸元位左目運左右目運右左右齊患則止從明堂位上分行雙運。

又導引法 保生秘要曰先以手抱崑崙仰頭吐氣或噓或呵瀉而復納次以二目轉動左右上下轉時先開後閉閉而復開隨時行之不間或動或運二者兼之。

運功 保生秘要曰雙瞳藏于兩腎想腎水浸洗能退熱運微



四散能去風。雙目視二腎。存兩道白水。運至眼中。着意。圖洗。磨  
剝。單去。腎。想二乳。下肺肋。推下脚股。吹吸之法。能退白上紅。以  
雙手向肩。匡兩脚心懸空。嗑吸。能退黑睛熱。能泄肝經之火。常  
注念。臍。緣取腎水。升洗覆臍。效。

肩稜骨痛。風痰濕火俱有病也。目系所過。上抵于腦。諸陽經挾外  
邪。鬱成風熱。毒上攻腦。下注目精。遂從目系過眉骨。相并不痛。若  
心肝壅熱。上攻目精而痛。亦目系與眉骨牽連而痛。故其為症。有  
由風痰眉骨痛。連于目不可開。晝靜夜劇者。宜芎辛導痰湯。有由痰火眉

心并眉梁骨痛者。宜二陳湯送。有由風熱挾痰而痛者。宜芷有中

風寒侵犯而痛者。宜羌散。有由濕痰眉眶骨痛而身重者。宜芎辛導痰湯加川

烏白木。大約選奇湯上清散二方。俱為總治眉稜骨痛之劑。戴復菴

分為二症。皆屬于肝。一為肝經傷頭痛。眼不可開。必晝靜夜劇。宜

痰湯加川一。為肝虛而痛。方見光明即發。宜生地黃丸

烏細辛。肩稜骨原由。醫說曰。肩屬肝。故橫生。稜木氣。肩所生處之骨。為肩稜骨。故其為病亦屬肝。

治目病方一百十七

導赤散

心火 生地 木通 甘草各一錢 竹葉七

桑皮湯

肺熱 桑皮 元參 枳壳 杏仁 升麻  
防風 赤芍 甘菊 黃芩 炙甘草 旋覆  
花 甜葶藶

清火止痛湯

總治 川連 元參 甘菊 連喬 黃芩  
木通 當歸 丹皮 白芍藥 木賊草 荊  
羊角 生地 藜精草

益氣聰明湯

脾胃 黃芪 甘草 人參 升麻 葛根  
白芍 黃柏 蔓荊子

熟地黃丸

腎虛 熟地 決明子 黃連 牛膝 酒黃  
柏子 杞子 兔絲子 柴胡 生地 五味子

養肝丸

肝虛 當歸 防風 川芎 楮寔 熟地  
菴仁 白芍 車前子

面部

眉稜骨

目病方

卷三十三 二九

龍管丸

肝火 龍胆草 薑薈 當歸 黑山糖 廣

四物龍胆湯

木香 黃連 黃芩 麝香 蜜丸 熟地  
又 龍胆草 川芎 當歸 白芍

湯泡散

羌活 防風 防已 當歸 黃連各一錢 滾水泡

還睛丸

又 人參 羌蔚子 知母 桔梗 熟地  
車前子 黃芩 細辛 元參 五味子

明目地黄丸

血虛 生地 熟地 牛膝 枳壳 防風  
杏仁 金石斛 當歸 白芍 地黃 牛膝

芎歸明目丸

甘草 杞子 天冬 甘菊 外障加木賊  
內障加珍珠

久患目疾方

久昏 杞子 甘菊 地黃 白蒺藜

瀉熱黃連湯

是熱 黃連 黃芩 升麻 柴胡 生地  
龍胆草

羞明立勝散

是熱 黃連 黃芩 防風 秦皮

黃連湯

又 決明子 甘菊 川芎 元參 陳皮  
黃連 細辛 甘草 薄荷 蔓荊子

決明子散

羌活 木賊草 決明子 石决明 甘草  
木賊草 決明子 石决明 甘草

蔓荆子

撥雲丹

芎藭 蔓荆子 木賊草 密蒙花 川芎各  
二錢 薄荷五分 黃連 當歸各二錢半 甘菊二錢  
六分 地骨皮 八分 川椒七分 甘草四分  
為末 空心水下

無比丸

赤爛 茯苓 甘草 防風各四兩 川芎  
石決明 當歸 羌活 赤芍 蟬退 蒼朮  
各二兩 白蒺藜 蛇退各一兩

甘菊湯

又 决明子 甘菊 當歸 川芎 赤芍  
甘草 防風 荆芥 蔓荆子  
近視 生地 天冬 枳壳 甘菊 蜜丸

烏金丹

飛絲 京墨一味 磨濃汁點之即出

羌柴湯

甚痛 蘇葉 防風 細辛各七分 荆芥  
羌活 柴胡 藁本 白芷各一錢  
時氣 白蒺藜 青箱子 木賊草 白芍  
草决明 山梔 當歸各一錢 黃連 黃芩

白蒺藜湯

服此忌暴怒酒色辛辣之物

洗眼湯

外洗 甘菊 玉竹各一錢  
細辛 竹葉 蘇葉各五分  
各三分 乘熱洗 有障加蟬退  
甘草 山梔 青鹽

加味地黃丸

久病 熟地 山萸 山藥 丹皮 茯苓  
當歸 黃連 澤瀉 人參

明目四神丸

又 杞子 八兩 酒水 并分 四股 一用 小荷 三錢  
炒去 荷 一用 川椒 三錢 炒出汗 去椒 一用 青鹽  
三錢 炒一用 黑芝麻 三錢 炒 白蒺藜 四兩  
歸頭 酒炒 熟地 各三兩 石決明 甘菊  
桑葉 穀精 草各二兩 蜜丸 每三錢 開水送

八味丸

溫補 地黃 山藥 山萸 丹皮 茯苓  
澤瀉 附子 肉桂

生熟地黃丸

血虛 生地 熟地 元參 石膏 各一兩  
蜜丸 空心 茶下

益陰腎氣丸

腎虛 熟地 二兩 酒生地 萸肉 各一兩  
山藥 丹皮 柴胡 歸尾 五味子 各五錢  
茯苓 澤瀉 各二錢 半 蜜丸 鹽湯下

滋腎明目丸

又 川芎 當歸 白芍 熟地 生地 各一錢  
錢 人參 桔梗 山梔 白芷 黃連 甘草  
菊 甘草 蔓荊子 各五分 加茶葉 灯心

駐景丸

肝腎 兔絲子五兩 車前子 熟地黃各三兩 蜜丸 一方加杞子一兩半 九佳

加減駐景丸

又 兔絲子八兩 楮寔 杞子 車前子 五兩 川椒各一兩 熟地 當歸各五錢

補肝散

各七錢半 羚羊角 防風各一兩 黃芩 人參 細辛 赤苓 筋脉枯澁 加夏枯草 每末二錢米飲下 如

補腎丸

又 菴容 杞子各一兩 巴戟 破故紙 山藥 茴香 丹皮各五錢 青鹽二錢半

通肝散

水醫 山梔 枳壳 甘草 荆芥 白蒺藜 各五錢 車前子 牛蒡子各二錢半 每末

八味還睛散

散醫 草決明一兩 白蒺藜 防風 木賊 草 山梔 甘草各五錢 青箱子 蟬退各

空青元

沉醫 防風 生地 知母各二兩 細辛 石決明 車前子 五味子各一兩 空青二

墜腎丸

黃心醫 青羊胆 青魚胆 鯉魚胆各七個 熊胆二錢半 牛胆五錢 麝香三分 水

面部 目病方

卷二十二

飛石决明一兩 麵糊丸茶下

### 凉膽元

防風 蘆薈各一兩 黃連 荆芥  
薤白 龍胆草 黃芩各五錢 地膚子 黃柏  
各二錢半 蜜丸薄荷湯下三十九

### 羚羊角散

綠風 甘菊 防風 川芎 羌活 川烏  
細辛 車前子 各五錢 羚羊角 半夏曲  
薄荷各二錢半 每末二錢生薑荆芥湯下

### 羚羊角丸

又 羚羊角一兩 犀角 石决明 車前子  
草决明各七錢半 獨活 防風 甘菊  
蔓荆子 山梔 藍寔 甘草各五錢 蜜丸

### 瀉肝散

烏風 大黃 甘草各五錢 郁李仁 荆芥  
穗各二錢半 一分二帖空心水煎服

### 雀盲散

雀目 雄猪肝竹刀批開納夜明砂扎好米泔  
煮七分熟取肝細嚼將汁送下 或雄猪肝煮  
熟和夜明砂為丸亦可

### 蛤粉丸

小兒 蛤粉 黃蠟 等分鎔蠟和蛤粉丸如  
蜜大用猪肝一片二兩許批開入藥一丸扎好  
水一碗煮熟取肝乘熱熏眼温食以愈止

風疖丸

又青魚 黃連 天麻 五靈脂 川芎  
夜明砂 蘆薈各二錢 龍胆草 防風 蟬  
退各錢半 全蝎二个 乾蟾頭三錢 猪肝  
汁浸糕和丸麻子大 每十九薄荷湯下 若  
用羊肝汁丸尤妙

還睛丸

高風 石决明 水飛 覆盆子 羌蔚子各二  
兩 槐寔 人參 細辛 防風 柏子仁  
茯苓 甘菊 川芎各一兩 蜜丸

補肝散

圓醫 柴胡 錢半 白芍一錢 熟地 茯苓  
甘菊 細辛 甘草各七分 柏子仁 防  
風各五分

蠟茶飲

夏枯草散

明目流氣飲

赤胛 芽茶 白芷 附子各一錢 細辛  
川芎 防風 羌活 荆芥各五分 鹽少許  
又夏枯草二兩 香附一兩 甘草五錢  
每末三錢 食後茶清調下 夏枯草治黑睛疼  
至夜甚者 最效 益黑睛連目系 屬厥陰之經 此  
物有補養厥陰血脈之功 故其效如此  
又蒼朮一兩 草决明七錢半 大黃 川  
芎 細辛 惡寔 甘菊 防風 白蒺藜  
荆芥 穗 元參 蔓荊子 木賊草 山梔  
黃芩 甘草各五錢 共為末

面部 目病方



羊肝元

又白羊子肝一具去膜黃連一兩先另研末和同研衆手作丸空心水下三十九連服五劑差青羊肝尤妙

神仙退雲丸

又酒當歸兩半木賊草去節童便浸焙川芎荆芥穗密蒙花地骨皮甘菊白蒺藜羌活各一兩川椒七錢半蔓荊子花粉枳寔薄荷草决明炙甘草各五錢蛇壳蝉壳黃連各三錢蜜丸每兩作十丸

地黄散

濕牖生地一兩赤芍當歸甘草各五錢每末五錢水煎服防風薄荷各一錢二分半蜜少許全煎

定心元

又麥冬一兩石菖杞子甘菊各五錢遠志二錢半蜜丸

速效散

又黃連黃柏黃芩山梔連喬薄荷荷葉胡荽荆芥當歸生地地骨皮花粉蔓荊子甘菊惡寔白蒺藜枳壳石决明草决明各五分水煎食後服

還睛紫金丹

爛弦風白蜜二兩爐甘石一兩煨淬水中十次水浸半日水飛黃丹六錢烏賊骨

去壳一錢 麝香 研砂研水飛入磁器中重  
湯煮令自乾 各五分 白丁香二分半 輕粉  
一分 先于砂石器內慢火熬蜜去沫下 甘石  
末次下 黃丹 柳枝攪再下 餘藥不粘手為度 九  
芡子大每一丸 溫水化開時點

聖草散

消風散

又 覆盆子 葉搗汁以皂紗蒙眼上將筆蘸汁  
回兩眸子紗上然後以汁滴之當有虫出  
又 荆芥 甘草 各一錢 人參 茯苓 川  
芎 姜蚕 防風 厚朴 各三分 藿香 蟬壳 各五  
分 陳皮 厚朴 各三分 每末二錢水下

石决明散

蜆目 石决明 草决明 各一兩 青箱子  
木賊草 羌活 山梔 赤芍 各五錢 大黃  
荆芥 各二錢半 每末二錢 麥冬湯下

消毒飲

白微元

黃芪散

風粟 煨大黃 荆芥 穗各二錢 惡臭 甘  
草各一錢 漏睛 白微 五錢 粉糊丸  
石榴皮 各二錢半 防風 羌活 白蒺藜  
又 黃芪 酒遠志 煨大黃 防風 各一錢  
地骨皮 水煎食後服 人參 赤苓 漏蘆 各五  
分

五退散

風驗 川山甲 川烏炮 炙草各五錢 蛇  
退醋煮 蚕退紙 蟬退 猪蹄壳 荆芥穗  
各二錢半 每末二錢食後 鹽湯下

春雪膏

瞼硬 漿仁去壳 皮研押去油二兩 冰片二  
錢半 生蜜六錢 研勻以銅箸蘸點  
此方兼治一切目赤腫痛淚出皆爛  
此又專治爛眼風多年連眶赤爛者最效  
購脹 龍胆草 山梔各二錢 防風 荆芥  
穗 龍胆草 元參 茵陳 甘菊 楮寔 甘  
草各一錢 每末二錢食後茶清下

龍胆散

清肺散

又桑皮 片苓 甘菊 枳壳 防風 荆  
芥 柴胡 升麻 赤芍 歸尾 元參 苦  
參 甘草 白茯苓 木賊草 旋覆花 甜  
葶藶 水煎食後服  
血瀝 川芎 歸尾 防風 荆芥各一兩  
生地 赤芍 甘草各五錢 蜜丸食後服  
又蜜蒙花 白茯苓 甘菊 羌活 草決  
明車前子 龍胆草 黃芩 甘草 等分  
為末每二錢米飲下

車前散

通血丸

洗心散

針刺癩 麻黃去節 荆芥穗 當歸 大黃  
赤芍 甘草各一錢 白木五分 薄荷七

葉 水煎服

天門冬飲子

天冬 知母 羌活 各七分 薤白 藜蘆 人參 各五分 水煎食後服

犀角散

犀角 各一兩 車前子 各一兩 梔子 各一兩 青箱子 各一兩 胡黃連 各七錢半 羚羊角 犀角 各五錢 兔肝 一具 微炙 每末二錢 食後浸一晝夜 切晒

蟬花無比散

白芍藥 各一兩 蒼朮 童便 浸一晝夜 切晒 荻藜 八錢 茯苓 四錢 蛇退 皂角 水浸焙 荆芥 細辛 各一錢 每末二錢 茶清下

槐子丸

槐子 二兩 覆盆子 惠仁 柏子仁 蔓荊子 車前子 荒蔚子 鼠粘子 白蒺藜 去刺 各一兩 蜜丸 酒下 三十九

犀角飲

犀角 二錢 羌活 黃芩 車前子 各一錢 白附子 麥冬 各五分 水煎食後服

白僵蚕散

黃桑葉 一兩 木賊草 旋覆花 荆芥穗 甘草 姜蚕 各三錢 細辛 五分 每末二錢 荊芥湯下 或取末七錢 水煎服 亦可

當歸龍薈丸

又龍胆草 當歸 山梔 黃連 黃柏  
黃芩各一兩 大黃 蘆薈 青黛各五錢  
木香二錢半 麝香五分 蜜丸姜湯下二三  
十丸

驅風一字散

眼痒 川烏 川芎 荆芥各五錢 羌活  
防風各二錢半 每末二錢食後薄荷湯下  
撞打 生地一合取汁 黃連一兩 黃柏  
寒水石各五錢 右三味為末和地黃汁作餅

地黃膏

以紙攤眼上  
此方兼治風熱赤目熱淚出皆

生地黄散

又羚羊角 生地 川芎 大黃 赤芍  
枳殼 木香各一錢 水煎食後服  
塵絲 瞿麥炒黃為末 鴨涎調和 逐時塗皆頭

瞿麥散

益本滋腎丸

酒黃柏 酒知母 等分水泛丸空心  
下五七十丸  
麥冬 當歸 車前各二兩 防風  
枳殼 青箱子各一兩 羌活 黃連各五錢  
于澤瀉 生地 石決明 黃連各五錢  
蜜丸空心麥冬湯下五七十丸

决明元

補陽湯

涼藥多 柴胡 錢半 羌活 獨活 人參  
甘草 熟地 白朮 黃芪各五分 澤瀉  
陳皮 防風 白芍 生地 茯苓 當歸  
知母各三分 肉桂一分 清晨服此湯臨臥

服連柏益陰丸

連柏益陰丸

又 草央明 酒黃蓮 黃芩 鹽酒黃柏  
益酒知母各一兩 羌活 獨活 五味子  
當歸 防風 甘草各五錢 石夾明二錢  
蜜丸茶清下 宜多服補陽湯少服此丸

蟬花散

病後 晉 蟬退 羌活 山梔 荆芥穗 葛荆  
决明 防風 密蒙花 木賊草去節童便浸  
子 穀精草 炙草 等分 為末每二錢茶下  
晒 蒼木 炙草 等分 為末每二錢茶下  
又 甘菊四兩 木賊草 羌活 蟬退 白  
疾藜各三兩 荆芥 甘草各二兩 每末二  
錢茶清下

菊花散

羌活退賢湯

太陽經 羌活錢半 防風一錢 薄荷 荆  
芥 藜本各七分 酒知母五分 酒黃柏四  
分 川芎 當歸各三分 麻黃 酒生地各  
二分 川椒 細辛各一分

羚羊角散

陷賢 羚羊角 升麻各二兩 甘草一兩半  
為末半蜜丸取末一錢泔水煎送五十九  
肝熱 富歸 龍胆草 川芎 黑山梔 煨  
大黃 羌活 防風 各等分蜜丸芥子大每  
一丸竹葉湯全砂糖化下 一各涼州丸

瀉青丸

烏賊骨散

瀉腎 烏賊骨 水片各一錢 為末日點三四次

洗肝散

肝積熱 羌活 當歸 薄荷 防風 炙甘草 大黃 川芎 山梔各一錢 加龍胆草一錢尤佳

局蜜蒙花散

又羌活 蜜蒙花 白蒺藜 木賊草 石决明

點石决明散

膜入水輪 石决明 珍珠 西珀各七錢五分 烏賊骨五錢 水片一錢 共為末以銅箸蘸取大豆許點眼日三

補腎元

此方兼治一切丁醫根脚極厚久不差者 黑腎 熟地 杷子 山萸 山藥 丹皮 補骨脂 核桃肉 蜜丸

磨腎膏

花腎 麩 仁口合去皮壳一兩 冰片三錢 空青二錢 研極細取少許點

清涼散

取腎 蔓荆子 荆芥穗 苦竹葉 甘草各錢半 山梔七分半 薄荷七片 水煎

經效散

撞刺腎 柴胡二錢 大黃 當歸 赤芍 犀角各一錢 甘草五分 食後服

觀音夢授丸

赤膜 夜明砂 富歸 蟬退 木賊草各三兩 羊肝四兩煮爛打膏為丸空心熱水下五十九丸百日如舊

百點膏

又黃連三錢剉水一碗煎至半碗入防風八分歸身甘草各六分麩仁泥三分全熬至滴水不散絞去渣入煉蜜少許再熬片時令靜心點之日五七次臨卧點尤效此方兼可點一切醫膜

春雪膏

眼昏 研極細每用少許口中津液和點閉目片時開眼淚出效 珊瑚砂三錢 冰片一錢 朴硝五錢

抑青明目湯

半夏 當歸 陳皮 白芍 生地 白木 赤苓 薏仁 甘草 柴胡 黃連 山梔 丹皮 龍胆草各七分 姜三盞二

夜光育神丸

熟地 生地 川連 遠志 牛膝 杞子 甘菊 枳壳 當歸 兔絲子 地骨皮 等分蜜丸空心酒下五七十九丸

滋陽地黃丸

眼花 當歸 五錢 生地 七錢半 川連 熟地 各一兩 柴胡 八錢 黃芩 六錢 天冬 地骨皮 五味子 各三錢 枳壳 炙草 各二錢 蜜丸茶清下百丸 亦各熟地黃丸 目漸昏乍明乍暗此失血之驗也宜此丸與定志丸間服



救苦湯

各一錢 蒼朮 龍胆草各錢半 當歸 甘草  
黃芩各五分 川芎六分 生地 知母  
黃連 藁本各三分 羌活 防風 升麻 柴胡  
紅花各二分 水煎食後服 桔梗 連喬 細辛

葉氏荷葉湯

失血 鮮荷葉 冬桑葉 赤苓皮 甘草  
萊豆皮 槽豆皮

葉氏羚羊角湯

高年 羚羊角 連喬心 夏枯草 丹皮  
青菊葉 桂枝 全當歸

葉氏夏枯草湯

風濕 夏枯草 桑葉 連喬 赤芍 草决

葉氏連喬湯

秋燥 連喬 薄荷 黃芩 山梔 桑皮  
苦丁茶 夏枯草 青菊葉

葉氏茯苓湯

熱蒸 冬桑葉 穀精草 望月砂 苡仁  
通草 萊豆皮 茯苓

葉氏山梔皮湯

鬱勃 山梔皮 夏枯草 穀精草 連喬  
草决明 望月砂 丹皮 生香附

葉氏桑葉湯

陽升 桑葉 丹皮 苡仁 川貝母 夏枯  
草 山梔

葉氏草决明湯

肝熱 草决明 冬桑葉 夏枯草 小胡  
麻 穀精草 丹皮

葉氏肝胃湯

肝胃 黃芪三錢 當歸 白芍各錢半 茯  
神三錢 煨姜一錢 南棗一枚

葉氏補肝湯

炒杞子 望月砂 製首烏 檀豆皮各三錢  
小胡麻各錢半 冬桑葉 黃菊花  
各一錢 石決明一具

葉氏兼補丸

焦頰 熟地 杞子 山萸 茯神 甘草  
生神麩 五味子 山藥 穀精草

治眉稜骨痛方九

二陳湯

痰火 茯苓 甘草 半夏 陳皮

青州白元子

又 半夏七兩 南星三兩 白附子二兩  
川烏五錢 共為細末 清水浸春五夏三秋七  
冬十朝夕換水日數足取納絹袋濾過渣再研  
濾澄清去水晒又為末米飲丸姜湯下三十九  
風寒 川烏童便浸二宿炒一錢 酒茶  
草 細辛 羌活各五分 為末分二服食後  
茶下

羌烏散

芎辛導痰湯

風濕痰 半夏錢半 南星 川芎 細辛  
赤苓 陳皮各一錢 枳壳 甘草各五分

生地黄丸

肝虛 生地 黃甘菊 防風 枳壳 決明  
子 石決明 白芍 茯神

熟地黃丸

又 金石斛 熟地 兔絲子 防風 羌蔚  
子 車前子 黃芪 覆盆子 肉蓯蓉 地

面部 目病方

膏子 磁石煨各一兩 兔肝一具炙乾 散

丸空心鹽湯下

### 芷芩散

風熱痰 白芷 酒黃芩 等分爲末每二錢

### 選奇湯

茶清下 羌活 防風 半夏各二錢 黃芩錢

### 上清散

總治 甘草一錢 加姜三片 又 川芎 鱗金 赤芍 荆芥 薄荷 羌  
稍各二錢半 乳香 沒藥各五分 冰片二  
分半 研末搐鼻